

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS**

**Grupo Químico:** Oxidocloruro de cobre pertenece al grupo químico de los compuestos de cobre.

**FUNGICUP® WG** es un fungicida a base de cobre, y que se considera ligeramente tóxico para los humanos y animales.

No comer, ni beber o fumar durante su aplicación y manipulación. Evitar la ingestión, inhalación y contacto con la piel.

**Equipo de protección personal:** Durante la preparación: delantal impermeable, botas de goma, guantes impermeables, mascarilla para polvos y protector facial.

**Durante la aplicación:** traje impermeable, botas de goma, guantes impermeables, mascarilla para polvos y protector facial. No aplicar contra el viento y una vez terminada la aplicación, cambiarse toda la ropa y lavarse con abundante agua. No contaminar fuentes ni cursos de agua. Conservar el producto en una bodega con llave, seca, fresca y ventilada, en su envase original, bien cerrado y provisto con su etiqueta. No almacenar junto a alimentos, semillas y forrajes.

**Información Ecotoxicológica:** FUNGICUP® WG es prácticamente no tóxico a peces y aves y virtualmente no tóxico a abejas.

**Síntomas de Intoxicación:** Dolores de cabeza, dolores estomacales e indigestión entre otros síntomas.

**Primeros auxilios: En caso de contacto con la piel:** retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usar.

**En caso de contacto ocular:** Lavar los ojos con abundante agua limpia por 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Si la persona utiliza lentes de contacto lavar con abundante agua por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 a 20 minutos. De ser necesario consiga ayuda médica inmediata. **En caso de inhalación:** Trasladar al afectado al aire fresco y facilitar la respiración aflojando las ropas. Si se requiere dar respiración artificial, llamar a un médico. **En caso de ingestión:** No inducir el vómito, lavar la boca con agua. Nunca de a ingerir o beber a una persona inconsciente. Buscar asistencia médica en forma inmediata.

**Antídoto:** En caso de intoxicación aguda utilizar Dimercaprol a 3-5 mg/kg/dosis o D-Penicilamina a 250 mg cada 8 horas.

**Tratamiento médico de emergencia:** ABC de reanimación, dilución con 120-140 ml de agua o leche, lavado gástrico, utilizar carbón activado y catártico salino. Manejar la hipotensión con volumen o drogas vasoactivas. Si el paciente está sintomático utilizar un agente quelante (Dimercaprol) 3-5 mg /kg/dosis. Penicilamina 250 mg cada 8 horas. Obtener un hemograma, test de función hepática y renal y niveles plasmáticos de cobre.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS**  
**EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD**  
**LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES**  
**NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.**  
**NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.**  
**LA ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.**  
**NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO.**  
**GUARDAR EN LUGAR FRESCO Y SECO.**

**En caso de intoxicación llamar:**  
**Centro Atención Toxicológica UC (CITUC), teléfono: 56 2 2635 3800 (24 horas).**

# FUNGICUP® WG

Fungicida-Bactericida  
 Granulado Dispersable (WG)

N° de Lote: Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2.460  
 Fecha Vencimiento:

**FUNGICUP® WG** es un fungicida bactericida de amplio espectro, destinado al control preventivo de las enfermedades y en los cultivos presentes en el Cuadro de Instrucciones de Uso de esta etiqueta.

**COMPOSICIÓN:**  
**Ingrediente Activo** % p/p  
 Oxidocloruro de cobre\* .....87,0% p/p (870 g/kg)  
 Coformulantes c.s.p. ....100% p/p (1kg)  
 (\*) Cloruro trihidroxido dicúprico (equivalente a 50% p/p (500 g/kg) de cobre)

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO**

**Contenido Neto: 20 Kg**

**Fabricado por:**

**Agrospec.**  
 Camino El Milagro 257  
 Maipú - Santiago, Chile  
 Telefono: 56 2 2836 8000  
 agrospec.cl

**UPL Limited**  
 610 B/2, Bandra Village,  
 Off Western Express Highway,  
 Bandra-East, Mumbai 400 051,  
 India

**Distribuido por:**



**Arysta LifeScience Chile S.A. una empresa UPL**  
 El Rosal 4610, Huechuraba, Santiago  
 ET2460-V002  
 Tel: 56 2 2560 4500 - 2560 4501  
<https://www.upl-ltd.com/cl>

**INSTRUCCIONES DE USO**

**Descripción:**  
**FUNGICUP® WG**, Es un fungicida-bactericida de amplio espectro destinado al control preventivo de enfermedades en frutales y hortalizas.

**CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO**

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	OBSERVACIONES
Duraznero Nectarino Ciruelo Almendro	Tiro de Munición Cáncer bacterial Cloca	300 - 500 g/100 L de agua	Iniciar las aplicaciones con un 20% de caída de hojas, y repetir 3 a 4 veces según condiciones predisponentes. Volver a aplicar a inicio de yema hinchada.
Guindo Cerezo	Cáncer bacterial Cloca	300 - 500 g/100 L de agua	Iniciar las aplicaciones con un 20% de caída de hojas, y repetir 3 a 4 veces según condiciones predisponentes.
Manzano	Cancro europeo	300 - 500 g/100 L de agua	Iniciar las aplicaciones con un 20% de caída de hojas, y repetir 3 a 4 veces según condiciones predisponentes. Volver a aplicar a inicio de yema hinchada.
Peral	Tizón bacteriano	300 - 500 g/100 L de agua	Iniciar las aplicaciones con un 20% de caída de hojas, y repetir 3 a 4 veces según condiciones predisponentes. Volver a aplicar a inicio de yema hinchada.
Nogal	Peste Negra	400 - 500 g/100 L de agua	1era: inicios de brotación 2da: inicios de floración 3era: con un 25% de flor pistillada 4ta: a finales de floración
Pomelo Mandarino Limón Naranja	Pudrición parda	300 - 500 g/100 L de agua	Aplicar antes o inmediatamente después de las primeras lluvias. Repetir en caso de lluvias frecuentes.
Vides	Mildiú	300 g/100 L de agua	Aplicar desde inicios de brotación. Si las lluvias persisten (condiciones predisponentes de infección) repetir cada 7-10 días. No aplicar en floración.
Papa* Tomate**	Tizón temprano Tizón tardío	3 - 5 kg/ha	Aplicar después que el cultivo alcance los 15 cm de altura y repetir cada 15 días hasta que finalice la floración.
Olivo	Repilo <i>Fusicladium (Spilocaea) oleagireum</i>	400 g/100 L de agua	Iniciar las aplicaciones en otoño al observar condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad, realizando la última aplicación a salidas de invierno. Mojamiento de 1.500 -2.000 L/ha. N° máximo de aplicaciones: 4 por temporada.

Se recomienda realizar un máximo de 5 aplicaciones en la temporada, dependiendo de las condiciones y del cultivo que se trate. La frecuencia de aplicación está sujeta a la condición de caída de hoja principalmente, pero esta no debe ser superior a 15 días. Los mojamientos dependen del cultivo y de la enfermedad, y varían de 1500 a 2000 L/ha.

**Carencias: (días):** En frutales no posee carencias, \*Papa:14 días, \*\*Tomate: 7 días.

**Preparación de la mezcla:** En el estanque de aplicación a medio llenar con agua y con el agitador en funcionamiento, agregar en forma lenta la cantidad requerida de **FUNGICUP® WG**. Una vez obtenida una mezcla homogénea, agregar el agua restante manteniendo la agitación.

**Fitotoxicidad:** no es fitotóxico si es usado de acuerdo a la forma y dosis que aquí se indican.

**Compatibilidad:** Compatible con la mayoría de los insecticidas de uso común.

**Incompatibilidad:** Evitar aplicar con Thiram y Dinitros.

**Tiempos de reingreso al área tratada:** Para personas no ingresar al área tratada antes de 24 horas después de la aplicación, sin equipo de protección, para animales no corresponde por no ser un cultivo destinado a la alimentación animal.

**Nota del fabricante:**

El fabricante certifica que este producto ha sido preparado en conformidad a lo especificado en la etiqueta, y garantiza una protección contra las enfermedades para las cuales es recomendado, siguiendo las instrucciones de uso. Este producto se expende dando por entendido que el comprador conoce los riesgos de uso y manipulación, lo que libera al vendedor de toda responsabilidad frente a las consecuencias de una mala manipulación o empleo.

© es Marca Registrada.



**CUIDADO**

